

LA GESTIONE DELLO SHOCK ANAFILATTICO A SCUOLA

A cura di:

Elena Bianchera -assistente sanitaria

Clotilde Chiozza -medico

Cecilia Donzelli - medico

Monica Toselli - infermiera professionale





CHE COS'E' L'ANAFILASSI?

Una reazione allergica forte, grave, detta sistemica, provocata da

ALLERGENI **SCATENANTI**

INGESTIONE DI
ALIMENTI E/O
ASSUNZIONE DI
FARMACI

PUNTURE DI
INSETTI

INALAZIONE DI
POLLINI, POLVERI,
FUMI, SMOG

CONTATTO CUTANEO
(ES: guanti in lattice, NICHEL,
detergenti, polveri.....)

QUALI SONO I SINTOMI DELLO SHOCK ANAFILATTICO?

- **PRURITO** generalizzato o localizzato
- **ERITEMA DIFFUSO, ORTICARIA;**
- **EDEMA (gonfiore) DEL VISO** con difficoltà a deglutire
- **RESPIRATORI:** tosse e difficoltà respiratoria
- **CARDIOCIRCOLATORI:** alterazione del battito cardiaco fino al collasso con perdita di coscienza
- **GASTROINTESTINALI:** dolori, crampi addominali, nausea e vomito



**APPENA CI SI ACCORGE DI UNO O PIU'
SINTOMI IN SOGGETTO ALLERGICO:
COSA FARE?**

1. Stendere il bambino/ragazzo in posizione supina sollevando gli arti inferiori
2. **SOMMINISTRARE ADRENALINA** soluzione iniettabile pronta all'uso

IMPORTANTE!

INIETTARE SUBITO ADRENALINA SENZA ASPETTARE!

***Si salva la vita e si previene l'insorgenza dell'anafilassi tardiva,
rischio sempre alto in soggetti allergici.***

3. Attivare il servizio 118
4. Avvisare i genitori

Che cos'è l'adrenalina?

È una sostanza chimica, prodotta anche naturalmente dall'organismo e che agisce



-sul cuore inducendolo ad aumentare la frequenza e la gittata migliorando così il flusso sanguigno verso i tessuti e il cervello

-sulle vie respiratorie per favorire l'apertura dei bronchi e quindi il passaggio dell'aria.

COME SI PREPARA, COME E DOVE SI SOMMINISTRA L'ADRENALINA

“Fastjeck adrenalina” è un'iniezione che ha la forma di una penna.



1. Togliere l'adrenalina dall'involucro che la contiene
2. Estrarre il tappo di sicurezza come nella figura



3. Impugnare l'iniettore e appoggiare l'estremità nera alla parte laterale della coscia



4. Premere con forza sulla coscia, **N.B. si deve sentire un piccolo scatto dell'ago.**
Mantenere la siringa in posizione almeno 10 secondi in modo da essere sicuri di avere somministrato il farmaco

5. Rimuovere l'iniettore e massaggiare lievemente la zona
(controllare che la punta dell'ago sia fuoriuscita dall'iniettore per verificare che l'adrenalina sia stata effettivamente iniettata)
6. Chiamare il 118
7. Consegnare agli operatori del servizio di emergenza e urgenza il flacone vuoto del farmaco FASTJEKT utilizzato



CONSERVAZIONE DELL'ADRENALINA A SCUOLA:

L'adrenalina deve essere conservata al riparo da fonti di luce e di calore.
A temperatura ambiente, custodita in un astuccio, borsa o armadietto
ha la durata di 1 anno.

Prima dell'utilizzo controllare che il liquido dell'adrenalina sia trasparente



DA RICORDARE...

**RICONOSCERE I SINTOMI DI UNO SHOCK ANAFILATTICO
IN UN BAMBINO SEGNALATO DAL MEDICO COME
ALLERGICO**

E' FONDAMENTALE PER LA SUA SALUTE

**INIETTARE ADRENALINA IN CASO DI CRISI ANAFILATTICA
SIGNIFICA SALVARGLI LA VITA!**